

Курсовая работа:

Режим переконденсации с компактным распределением размеров капель.

Выполнил: [Телятник Родион, 306 группа](#)



Подпись:



Научный руководитель: [Аджемян Лоран Цолакович](#)

Подпись:

30 мая 2008

Описание проблемы и постановка задачи.

Классические работы Дж.Гиббса, М.Фольмера, Ф.Беккера, В.Дёринга, Я.Френкеля, Я.Зельдовича по физике фазовых переходов I рода относятся к ранним стадиям зарождения новой фазы.

В данной же работе нас интересует процесс конденсации, переходящий из флуктуационного режима роста зародышей новой фазы в стадию переконденсации, именуемую также коалесценцией, или Оствальдовским созреванием [1], когда рост крупных капель происходит за счёт растворения более мелких (при условии, что все капли далеки друг от друга).

Режим переконденсации может проходить в одном случае под управлением поглощающей способности поверхности (теория Вагнера: [2]), когда длина свободного пробега λ молекулы много больше радиуса капли R , а в другом случае под управлением диффузии в паре (теория Лифшица-Слёзова: [3], [4]), когда $\lambda \ll R$.

Причиной расхождения эксперимента с теорией Лифшица-Слёзова-Вагнера оказалось допущение неограниченного объёма кластеров новой фазы [5]. Поэтому все дальнейшие теоретические исследования Оствальдовского созревания предполагают компактное основание распределения капель по размерам [6], [7], [8].

Поэтому задачей данной работы является описание уравнений и параметров режима переконденсации в условиях существования максимального размера капли.

Коалесценция имеет большое практическое значение, например, в образовании и стабильности поверхностей [9], [10], [11].

Оглавление

Курсовая работа:

Режим переконденсации с компактным распределением размеров капель.

Описание проблемы и постановка задачи.	1
Оглавление	2
1). Переписывание уравнений в терминах максимальной капли.....	3
2). Соотношения интегральных моментов функции распределения.....	5
3). Нахождение автомодельной функции распределения.	6
4). Нормировка функции распределения.	9
5). Предельный случай – распределение Лифшица-Слэзова.....	10
6). Графики.....	11
7). Литература.....	12
8) Ссылки.....	12

1). Переписывание уравнений в терминах максимальной капли.

Оригинальные уравнения теории переконденсации записываются в терминах отношения безразмерного радиуса капли к её критическому радиусу в зависимости от безразмерного времени: $u(\tau) = \frac{a}{a_c(\tau)}$. Наша задача – переписать их в терминах отношения радиуса капли

к максимальному радиусу: $v(\tau) = \frac{a}{a_m(\tau)} \in (0,1]$.

Уравнение роста радиуса капли в режиме коалесценции Лифшица-Слэзова:

$$\partial_\tau a(\tau) = \frac{1}{a(\tau)} \left(\frac{1}{a_c(\tau)} - \frac{1}{a(\tau)} \right) \quad (1.1)$$

Тогда уравнение непрерывности для функции распределения по размерам капель:

$$\partial_\tau f(a, \tau) = -\partial_a \left(\frac{1}{a} \left(\frac{1}{a_c} - \frac{1}{a} \right) \cdot f(a, \tau) \right) \quad (1.2)$$

Подставляем сюда асимптотический анзац Лифшица-Слэзова в новых переменных и с явной зависимостью от времени:

$$f(a, \tau) = N \frac{1}{a_m^4(\tau)} P(v(\tau), \tau) \quad (1.3)$$

Преобразуем дифференциальное уравнение (обозначая $\dot{a}_m(\tau) \equiv \frac{d}{d\tau} a_m(\tau)$):

$$-4 \frac{\dot{a}_m}{a_m^5} P - \frac{a}{a_m^2} \dot{a}_m \frac{1}{a_m^4} \partial_v P + \frac{1}{a_m^4} \partial_\tau P = \frac{1}{a_m^4} \left(\frac{1}{a^2 a_c} - \frac{2}{a^3} \right) P - \frac{1}{a_m^4} \left(\frac{1}{a a_c} - \frac{1}{a^2} \right) \frac{1}{a_m} \partial_v P$$

$$-4 \dot{a}_m P - \dot{a}_m v \partial_v P + a_m \partial_\tau P = \left(\frac{1}{a_m a_c v^2} - \frac{2}{a_m^2 v^3} \right) P - \left(\frac{1}{a_m a_c v} - \frac{1}{a_m^2 v^2} \right) \partial_v P$$

$$\left(-\frac{1}{a_m^2 v^2} + \frac{1}{a_m a_c v} - \dot{a}_m v \right) \partial_v P + a_m \partial_\tau P = \frac{1}{a_m^2} \left(\frac{a_m}{a_c v^2} - \frac{2}{v^3} + 4 \dot{a}_m a_m^2 \right) P$$

Введём

$$\gamma(\tau) = \frac{1}{\dot{a}_m(\tau) \cdot a_m^2(\tau)} \quad (1.4)$$

$$\left(-\gamma \frac{1}{v^2} + \gamma \frac{a_m}{a_c} \frac{1}{v} - v \right) \partial_v P + \frac{a_m}{\dot{a}_m} \partial_\tau P = \left(\gamma \frac{a_m}{a_c} \frac{1}{v^2} - 2\gamma \frac{1}{v^3} + 4 \right) P$$

$$\left(-\gamma + \gamma \frac{a_m}{a_c} v - v^3\right) v \partial_v P + \frac{a_m}{\dot{a}_m} v^3 \partial_\tau P = \left(\gamma \frac{a_m}{a_c} v - 2\gamma + 4v^3\right) P \quad (1.5)$$

Избавимся от a_c , подставив a_m в уравнение роста радиуса капли (1.1):

$$\dot{a}_m = \frac{1}{a_m} \left(\frac{1}{a_c} - \frac{1}{a_m} \right) \Rightarrow \frac{a_m}{a_c} = \frac{1}{\gamma} + 1 \quad (1.6)$$

С учётом этого, а также определения $\gamma(\tau)$ в (1.4), докажем, что $v=1$ является корнем кубического полинома:

$$G_3(v) = -\gamma + \gamma \frac{a_m}{a_c} v - v^3 \quad (1.7)$$

$$\begin{aligned} -\gamma + \gamma \frac{a_m}{a_c} - 1 &= -\frac{1}{\dot{a}_m a_m^2} + \frac{1}{a_c \dot{a}_m a_m} - 1 = \frac{1}{a_c a_m^2 \dot{a}_m} (-a_c + a_m - a_c a_m^2 \dot{a}_m) = \\ &= \frac{1}{a_c \dot{a}_m a_m^2} \left(-a_c + a_m - a_c a_m^2 \left(\frac{1}{a_m a_c} - \frac{1}{a_m^2} \right) \right) = \frac{1}{a_c \dot{a}_m a_m^2} (-a_c + a_m - a_m + a_c) \equiv 0 \end{aligned}$$

Тогда (1.5) окончательно запишется следующим уравнением на функцию распределения:

$$\boxed{\underbrace{\left(-\gamma + (\gamma + 1)v - v^3\right)}_{G_3(v)} v \partial_v P + a_m \gamma v^3 \partial_\tau P = \underbrace{\left((\gamma + 1)v - 2\gamma + 4v^3\right)}_{H_3(v)} P} \quad (1.8)$$

Зная один корень, найдём делением по схеме Горнера квадратичное выражение в $G_3(v) = (v-1)G_2(v)$

корень	$G_3(v)$	v^3	v^2	v^1	v^0
		-1	0	$\gamma + 1$	$-\gamma$
1	$G_2(v)$	v^2	v^1	v^0	остаток
		-1	$0 + (-1) \cdot 1$	$(\gamma + 1) + (-1) \cdot 1$	$-\gamma + \gamma$

остаток = нулю

Таким образом:

$$G_2(v) = -v^2 - v + \gamma$$

Решим квадратное уравнение, полагая корни существующими:

$$v = -\frac{1 \pm \sqrt{1+4\gamma}}{2} = -\frac{1}{2} \mp \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}$$

Тем самым мы разложили на множители $G_3(v) = -(v_1 - v)(v - v_2)(v_3 - v)$, где

$$v_1 = 1 \quad v_2 = -\frac{1}{2} - \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \quad v_3 = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \quad \gamma \geq -\frac{1}{4} \quad (1.9)$$

Каждая скобка в таком виде разложения, как мы увидим далее, будет положительна. Заметим также, что $v_1 + v_2 + v_3 = 0$ (так что $v_2 = -v_3 - 1$), что, впрочем, сразу следует из теоремы Виета для $G_3(v)$ по отсутствию квадратичного члена.

Итак, уравнение (1.8) запишется следующим образом:

$$(1-v) \left(v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v \right) v \partial_v P + a_m \gamma v^3 \partial_\tau P = (-4v^3 - (\gamma + 1)v + 2\gamma) P \quad (1.10)$$

В этой работе мы рассмотрим автомодельную функцию $P = P(v)$, не зависящую явно от времени, при этом в полученном дифференциальном уравнении опускается член $a_m \gamma v^3 \partial_\tau P$ с частной производной по времени от функции распределения.

2). Соотношения интегральных моментов функции распределения.

Соотношения между интегральными моментами функции распределения можно найти, не зная её явного вида. Для этого проинтегрируем от 0 до 1 левую и правую части дифференциального уравнения (1.8), опуская член с производной по времени и вводя моменты:

$$M_n = \int_0^1 v^n P(v) dv \quad (2.1)$$

$$\int_0^1 (-\gamma + (\gamma + 1)v - v^3) v \frac{dP}{dv} dv = \int_0^1 ((\gamma + 1)v - 2\gamma + 4v^3) P dv = (\gamma + 1)M_1 - 2\gamma M_0 + 4M_3$$

Интегрируем по частям левую часть:

$$\underbrace{vG(v)P(v)}_0 \Big|_0^1 + \int_0^1 P(v) \frac{d}{dv} (\gamma v - (\gamma + 1)v^2 + v^4) dv = (\gamma + 1)M_1 - 2\gamma M_0 + 4M_3$$

$$\int_0^1 P(v) (\gamma - 2(\gamma + 1)v + 4v^3) dv = (\gamma + 1)M_1 - 2\gamma M_0 + 4M_3$$

$$\gamma M_0 - 2(\gamma + 1)M_1 + 4M_3 = (\gamma + 1)M_1 - 2\gamma M_0 + 4M_3$$

$$3\gamma M_0 = 3(\gamma + 1)M_1$$

$$\frac{M_1}{M_0} = \frac{\gamma}{\gamma + 1} \quad (2.2)$$

Это выражение, в сущности, означает, что $\bar{v} \equiv \frac{\bar{a}}{a_m} = \frac{\gamma}{\gamma+1}$, а если вспомнить отношение

(1.6) между максимальным и критическим радиусами капли, то получим равенство среднего и критического радиусов:

$$\bar{a} = a_m \frac{\gamma}{\gamma+1} = a_c \quad (2.3)$$

$M_0 = 1$, когда функция распределения нормирована на единицу (см. [пункт 4](#))

3). Нахождение автомобильной функции распределения.

По-прежнему полагая автомобильным $P = P(v)$ и убирая в (1.10) член с производной по времени, можно явно решить дифференциальное уравнение интегрированием:

$$\int \frac{dP}{P} = \int \frac{-4v^3 - (\gamma+1)v + 2\gamma}{v(1-v) \left(v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v \right)} dv \quad (3.1)$$

Для этого разложим подынтегральное выражение на простейшие дроби и найдём коэффициенты:

$$\frac{A}{v} + \frac{B}{1-v} + \frac{C}{v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}} + \frac{D}{\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v} = \frac{-4v^3 - (\gamma+1)v + 2\gamma}{v(1-v) \left(v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v \right)}$$

$$A(1-v) \left(v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v \right) + Bv \left(v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v \right) +$$

$$+ Cv(1-v) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v \right) + Dv(1-v) \left(v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right) = -4v^3 - (\gamma+1)v + 2\gamma$$

При $v = 0$:

$$A \left(\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} \right) = 2\gamma \quad \Leftrightarrow \quad A = \frac{2\gamma}{\left(\gamma + \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{4}} = 2$$

При $v = 1$:

$$B \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{3}{2} \right) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{3}{2} \right) = -4 - (1+\gamma) + 2\gamma \quad \Leftrightarrow \quad B = \frac{\gamma-5}{\gamma + \frac{1}{4} - \frac{9}{4}} = \frac{\gamma-5}{\gamma-2}$$

Приравнивание коэффициентов при v^3 :

$$A - B + C - D = -4 \quad \stackrel{A=2}{\Rightarrow} \quad C = -6 + D + B$$

Приравнивание коэффициентов при v^2 (находим D):

$$-A \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} \right) + A \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{1}{2} \right) - A + B \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} \right) - B \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{1}{2} \right) - C \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} \right) - C - D \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{1}{2} \right) + D = 0$$

$$-B - C \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{1}{2} \right) = D \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} \right)$$

$$-B - (-6 + D + B) \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{1}{2} \right) = D \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} \right)$$

$$-B + 6 \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{1}{2} \right) - B \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{1}{2} \right) = D \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{1}{2} \right)$$

$$D = \frac{6\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + 3 - B \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + \frac{3}{2} \right)}{2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}} = 3 + \frac{3}{2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}} - \frac{B}{2} \left(1 + \frac{3}{2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}} \right)$$

$$D = 2 + \left(1 - \frac{B}{2} \right) \left(\frac{3}{2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}} + 1 \right) \quad (3.2)$$

Подставляя полученное выражение для B , выразим D только через γ и избавимся от иррациональности в знаменателе:

$$D = 2 + \frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 2)} \cdot \frac{9 - 4 \left(\frac{1}{4} + \gamma \right)}{2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \left(3 - 2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right)} = 2 + \frac{\gamma + 1}{\gamma - 2} \cdot \frac{2 - \gamma}{3\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - 2\gamma - \frac{1}{2}}$$

$$D = 2 - \frac{(\gamma + 1) \left(3\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} + 2\gamma + \frac{1}{2} \right)}{9 \left(\frac{1}{4} + \gamma \right) - 4\gamma^2 - 2\gamma - \frac{1}{4}} = 2 + \frac{2\gamma^2 + \frac{5}{2}\gamma + \frac{1}{2} + 3(\gamma + 1)\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}}{4\gamma^2 - 7\gamma - 2}$$

$$D = \frac{10\gamma^2 - \frac{23}{2}\gamma - \frac{7}{2} + 3(\gamma+1)\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}}{(4\gamma+1)(\gamma-2)} \quad (3.3)$$

Таким образом, найдены все коэффициенты в разложении на простые дроби подынтегрального выражения в (3.1), интегрируя их, получаем, помня об области определения переменных:

$$\widetilde{Const}(\gamma) + \ln P = 2 \ln v - B \ln(1-v) + (-6 + D + B) \ln \left(v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right) - D \ln \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v \right)$$

$$P = Const(\gamma) \cdot v^2 (1-v)^{-B} \left(v + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right)^{-6+D+B} \left(\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} - \frac{1}{2} - v \right)^{-D}$$

В значениях v_3 (третий корень $G_3(v)$) из (1.9) окончательно запишем:

$$P(v) = Const(\gamma) \cdot \frac{v^2 (1-v)^\mu}{(v+1+v_3)^{6+\mu-D} (v_3-v)^D} \quad (3.4)$$

Где в силу физической ограниченности функции распределения на конце интервала, полагаем:

$$P(1) < \infty \quad \Rightarrow \quad \mu \equiv -B = \frac{5-\gamma}{\gamma-2} \in [0, +\infty) \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{2\mu+5}{\mu+1} \in (2, 5] \quad (3.5)$$

Оценим выражение для D из (3.2):

$$D = 2 + \left(1 + \frac{\mu}{2} \right) \left(\frac{3}{2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}} + 1 \right) \in \left[3 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{21}} \right), +\infty \right) \subset [3.654, +\infty) \quad (3.6)$$

Дифференцированием (3.3) и грубой оценкой можно увидеть, что D монотонно убывает по γ из бесконечности, как и μ . При этом величина $\mu - D$, фигурирующая в (3.4), остаётся ограниченной (не имеет особенности при $\gamma = 2$), более того почти постоянной в заданном интервале γ , в чём можно убедиться, вычитая D в форме (3.6) из μ и выражая всё через γ :

$$\mu - D = -4 - \left(1 + \frac{\mu}{2} \right) \left(\frac{3}{2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}} - 1 \right) = -4 - \frac{\gamma+1}{2(\gamma-2)} \cdot \frac{9-4\left(\frac{1}{4} + \gamma\right)}{2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \left(3 + 2\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} \right)} =$$

$$= -4 + \frac{\cancel{2}^{\gamma+1}}{\cancel{2}^{\gamma}} \cdot \frac{\cancel{2}^{\gamma}}{3\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma + 2\left(\frac{1}{4} + \gamma\right)}} = \frac{\gamma+1}{2\gamma + 3\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma + \frac{1}{2}}} - 4$$

$$\mu - D = \frac{\gamma+1}{2\gamma + 3\sqrt{\frac{1}{4} + \gamma + \frac{1}{2}}} - 4 \in \left[-\frac{11}{3}, -3\left(1 + \frac{1}{\sqrt{21}}\right) \right] \subset [-3.667, -3.654] \quad (3.7)$$

4). Нормировка функции распределения.

Как в [пункте 2](#) проинтегрируем от 0 до 1 левую и правую части (1.8) (без члена с производной по времени), предварительно разделив их на v^3 :

$$\int_0^1 \left(-\frac{\gamma}{v^2} + \frac{(\gamma+1)}{v} - v \right) \partial_v P dv = \int_0^1 \left(\frac{(\gamma+1)}{v^2} - \frac{2\gamma}{v^3} + 4 \right) P(v) dv$$

Формально интегрируем по частям левую часть:

$$\left(-\frac{\gamma}{v^2} + \frac{(\gamma+1)}{v} - v \right) P(v) \Big|_0^1 - \int_0^1 \left(\cancel{2}^{\frac{\gamma}{v^3}} - \frac{(\gamma+1)}{\cancel{v^2}} - 1 \right) P(v) dv = \int_0^1 \left(\frac{(\gamma+1)}{\cancel{v^2}} - \cancel{2}^{\frac{\gamma}{v^3}} + 4 \right) P(v) dv$$

$$-\left(-\frac{\gamma}{v^2} + \frac{(\gamma+1)}{v} - v \right) P(v) \Big|_{v=0} = 3 \int_0^1 P(v) dv$$

$$\int_0^1 P(v) dv = \frac{1}{3} \left(\frac{\gamma}{v^2} - \frac{(\gamma+1)}{v} + v \right) P(v) \Big|_{v=0}$$

Удовлетворяя условию нормировки, подставим $P(v)$ из (3.4). При $v=0$ сохранится только первый член:

$$1 = \int_0^1 P(v) dv = \text{Const}(\gamma) \frac{\gamma}{3} \frac{1}{(1+v_3)^{6+\mu-D} v_3^D}$$

$$\text{Const}(\gamma) = \frac{3}{\gamma} (1+v_3)^{6+\mu-D} v_3^D \quad (4.1)$$

Так что функция распределения (3.4) в нормированном виде равна:

$$P(v) = \frac{3}{\gamma} \frac{v^2 (1-v)^\mu}{\left(1 + \frac{v}{1+v_3}\right)^{6+\mu-D} \left(1 - \frac{v}{v_3}\right)^D} \quad (4.2)$$

Из самого дифференциального уравнения (1.10) легко выписать производную функции распределения:

$$\frac{dP(v)}{dv} = \frac{3}{\gamma} \frac{v^2(1-v)^{\mu-1}(-4v^3 - (\gamma+1)v + 2\gamma)}{v_3(1+v_3) \left(1 + \frac{v}{1+v_3}\right)^{7+\mu-D} \left(1 - \frac{v}{v_3}\right)^{D+1}} \quad (4.3)$$

Приравняв её нулю и решая каноническое кубическое уравнение $v^3 + \frac{(\gamma+1)}{4}v - \frac{\gamma}{2} = 0$ по формуле Кардано, имеем для максимума функции распределения, изменяющего своё положение с изменением γ :

$$v_m = \sqrt[3]{\frac{\gamma}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{\gamma^2 + \frac{(\gamma+1)^3}{108}}} + \sqrt[3]{\frac{\gamma}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{\gamma^2 + \frac{(\gamma+1)^3}{108}}} \quad (4.4)$$

$$\gamma \in (2, 5] \Rightarrow v_m \in \left(\frac{1}{2} \left(\sqrt[3]{4 + \sqrt{17}} - \sqrt[3]{4 - \sqrt{17}} \right), 1 \right] \subset (0.756, 1]$$

5). Предельный случай – распределение Лифшица-Слёзова.

Рассмотрим предельный случай при $\gamma \rightarrow 2+$. При этом из (3.3) $\Rightarrow D \underset{\gamma \rightarrow 2+}{\sim} \frac{3}{\gamma-2}$, а из (3.5)

$\Rightarrow \mu \underset{\gamma \rightarrow 2+}{\sim} \frac{3}{\gamma-2}$. Тогда как их разность $\mu - D \xrightarrow{\gamma \rightarrow 2} -\frac{11}{3}$, что было показано в (3.7). Нам

также пригодится асимптотика: $v_3 - 1 = -\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma} = \frac{\gamma-2}{\frac{3}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \gamma}} \underset{\gamma \rightarrow 2+}{\sim} \frac{\gamma-2}{3}$

$$P_{LS}(v) = \lim_{\gamma \rightarrow 2+} \frac{3}{\gamma} \frac{v^2(1-v)^\mu}{\left(1 + \frac{v}{1+v_3}\right)^{6+\mu-D} \left(1 - \frac{v}{v_3}\right)^D} = \frac{3}{2} \cdot \frac{v^2}{\left(1 + \frac{v}{2}\right)^{6+\mu-D}|_{\gamma=2} (1-v)^{D-\mu}|_{\gamma=2}} \cdot \lim_{\gamma \rightarrow 2+} \left(\frac{1-v}{1 - \frac{v}{v_3}} \right)^D$$


$$\lim_{\gamma \rightarrow 2+} \left(\frac{1-v}{1 - \frac{v}{v_3}} \right)^D = \lim_{\gamma \rightarrow 2+} \left(1 + \frac{\frac{v}{v_3} - v}{1 - \frac{v}{v_3}} \right)^D = \lim_{\gamma \rightarrow 2+} \left(1 - \frac{v}{v_3 - v} (v_3 - 1) \right)^D = \lim_{\gamma \rightarrow 2+} \left(1 - \frac{v}{v_3 - v} \frac{\gamma-2}{3} \right)^{\frac{3}{\gamma-2}} = e^{\lim_{\gamma \rightarrow 2+} \left(-\frac{v}{v_3 - v} \right)}$$

$$P_{LS}(v) = \frac{3}{2} \cdot \frac{v^2}{\left(1 + \frac{v}{2}\right)^{\frac{7}{3}} (1-v)^{\frac{11}{3}}} \exp\left(-\frac{v}{1-v}\right) \quad (5.1)$$

Приведём для сравнения функцию Лифшица-Слёзова, записанную в оригинальных переменных $u = \frac{a}{a_c(\tau)}$:

$$P_{LS}(u) = \frac{81}{16} \cdot \frac{u^2}{\left(\frac{3}{2} + \frac{u}{2}\right)^{\frac{7}{3}} \left(\frac{3}{2} - u\right)^{\frac{11}{3}}} \exp\left(-\frac{u}{\frac{3}{2} - u}\right), \quad u \leq \frac{3}{2} \quad (5.2)$$

6). Графики.



Здесь нарисованы функции распределения $P(v; \gamma)$ из (4.2), охватывающие весь интервал возможных γ вплоть до функции Лифшица-Слёзова (5.1).

7). Литература.

1. А.Н.Васильев, А.К.Казанский, Л.Ц.Аджемян: «Переконденсация пересыщенного пара: аналитические теории и численный эксперимент».
2. П.Губанов, Ю.Желтов, И.Максимов, В.Морозов: «Кинетический кроссовер режимов коалесценции в пересыщенном однородном растворе».
3. В.Бойко, Х.Могель, В.Сысоев, А.Чалый «Особенности метастабильных состояний при фазовых переходах жидкость-пар»
4. В.Ф.Разумов: «Курс лекций по синергетике».
5. Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский: «Физическая кинетика».
6. В.Giron, В.Meerson, P.V.Sasorov: «Weak selection and stability of localized distributions in Ostwald ripening».
7. V.M.Burlakov: «Ostwald Ripening on nanoscale».
8. В.Niethammer, R.L.Pego: «Non-self-similar behavior in the LSW theory of Ostwald ripening».

Перечисленные и многие другие материалы по теме временами доступны по ftp здесь: <ftp://rodion.homeftp.net> → Work → =Учёба= → Кафедра статфизики → =Курсовая= → Литература

8) Ссылки

- [1] W.Z.Ostwald // *Phys. Chem.* **37**, 385 (1901)
- [2] C.Z.Wagner // *Electrochem.* **65**, 581 (1961)
- [3] М.Лифшиц, В.Слёзов // *ЖЭТФ* **35**, 479 (1958)
- [4] M.Lifshitz, V.Slyozov // *J.Phys.Chem.Solids* **19**, 35 (1961)
- [5] J. Alkemper, V.Snyder, N.Akaiwa, P.Voorhees // *Phys.Rev.Lett.* **82**, 2725 (1999)
- [6] N.Akaiwa, P.Voorhees // *Phys.Rev.B* **49**, 3860 (1994)
- [7] D.Fan, S.Chen, L.Chen, P.Voorhees // *ActaMaterialia* **50**, 1895 (2002)
- [8] K.Wang, M.Gliksman, K.Rajan // *Comput.Mat.Sci.* **34**, 235 (2005)
- [9] S.Kukushkin, A.Osipov // *Progress in Surf. Sci.* **51**, 1 (1996)
- [10] M.Zinke-Allmang, L.Feldman, M.Grabow // *Surf. Sci.Rep.* **16**, 377 (1992)
- [11] W. Bartelt, C.Theis, M.Tromp // *Phys.Rev. B* **54**, 11741 (1996)